



BACTERIURIE ASYMPTOMATIQUE CHEZ LES PATIENTS INSTITUTIONNALISES

Rédaction	B Doudier
Validation du 27 07 2022	F Fenollar – P Brouqui – S Baron – V Mondain
Approbation	

Bactériurie asymptomatique des patients institutionnalisés

→ Définition :

Données d'interprétation **en l'absence** de dispositif endo-urinaire :

- Seuil de leucocyturie $\geq 10^4$ /ml
- Présence d'une bactérie en culture

Et absence de symptomatologie évocatrice:

Pas de dysurie, pollakiurie, brûlures mictionnelles, hématurie

Pas de tension sus-pubienne

Pas d'incontinence urinaire récente

Pas de chutes inexpliquées

Pas de somnolence, apparition ou aggravation d'une anorexie, désorientation, aggravation d'une dépendance

- Ne pas tenir compte de la CRP, ni de la procalcitonine : aucune valeur discriminante, ne pas faire d'ECBU sur ces seuls critères biologiques sans point d'appel clinique.

- Toujours rechercher une autre cause qu'une colonisation urinaire devant un patient âgé avec les signes suivants : chute, détérioration des fonctions cognitives, confusion, troubles de la conscience, instabilité hémodynamique, fécalome.

Traitement		
AUCUN		

- Pas de BU, ni d'ECBU chez les patients **asymptomatiques** institutionnalisés.
- 20 à 50% des patients institutionnalisés sont porteurs d'une bactériurie asymptomatique selon les études.

Références :

Pilly – édition 2021.

Sanford guide 2022.

IDSA guidelines on asymptomatic bacteriuria. *Clin Inf Dis* 2019 ; 68 : 1611.