



INFECTION URINAIRE MASCULINE PROSTATITE AIGUE SIMPLE

Rédaction	B Doudier, P Seisson
Validation du 07 12 2022	F Fenollar – P Brouqui – S Baron – V Mondain
Approbation	

Prostatite aigue sans signes de gravité :

→ Définition :

Un homme avec des signes urinaires de type : brûlures mictionnelles, dysurie, pollakiurie, douleur pelvienne. Il peut s'y associer de la fièvre et des frissons.

Il n'existe pas de signes de gravité : Sepsis ($qSOFA \geq 2$), choc septique ou besoin d'un drainage des urines autre qu'un simple sondage.

Le sepsis est défini par la présence d'au moins 2 critères parmi les 3 suivants du $qSOFA$ (1 point par item) :

- Fréquence respiratoire >22
- Troubles des fonctions supérieures (confusion, désorientation, Glasgow <15)
- Pression artérielle systolique ≤ 100 mmHg

$qSOFA$ score ≥ 2 = mortalité $\geq 10\%$.

Rechercher systématiquement une rétention aigue d'urines qui indique l'hospitalisation en urgence pour drainage des urines.

→ Prélèvement : **ECBU obligatoire** avant traitement, hémocultures si possible ou doute diagnostique

Ecologie microbienne chez l'homme dans les urines (PACA), données PACAsurv 2019-2021 :
Escherichia coli (43,6%) ; *Enterococcus faecalis* (17,6%) ; *Klebsiella pneumoniae* (9,6%) ; *Proteus mirabilis* (6,4%) ;
Pseudomonas aeruginosa (5,2%)

Traitement empirique	Molécule, posologie et voie d'administration	Durée
1^{ère} intention	Ciprofloxacine 500 mg x 2/j <i>per os</i>	14 jours A réévaluer
Alternative	Ceftriaxone 1g/j en 1 injection IM/IV/SC (2g/j si IMC > 30)	

/!\ Attention, les antibiotiques retenus ci-dessus ne couvrent pas les entérocoques. Devant une forme pauci-symptomatique, l'antibiothérapie peut être différée au résultat de l'ECBU.

Traitement à adapter au micro-organisme identifié et à son antibiogramme en choisissant une molécule à bonne diffusion prostatique.

Références:

Pilly – 2021 - Sanford guide – Up to date 2022